Liik eesti ja ladina keeles	Iseloomustus	Kasvukoht	Hooldamine	Paljundamine, ümberistutamine	Haigused,kahjurid
prk aaloe *Aloe spp.* **Harilik aaloe** *Aloe vera* põletuste, nahaärrituste leevendaja. *Aloe* tuleneb araabiakeelsest sõnast *alloeh* – nii nimetati kuivanud aaloemahla	Lehed on paljudel liikidel paksud, lihakad, pealt nõgusad, ogaliste servadega ja sageli heledate vöötide või tähnidega. Õied kollased. Vajab õitsemiseks palju valgust.	Päikseline . Õhu temp. kp18°24° pp 13°-18° Muld liivasegune, Sõmer, vett läbilaskev, kaktusemuld pH6-7 õhuniiskus madal	Vähene kastmine, talvel hoida peaaegu kuivana, mitte väetada. Kevadest sügiseni väetada 4-6 nädala tagant. Vältida kodarikule kastmist ja seisvat vett. Kärbunud,kortsus lehed-vee puudus.Kasta ,piserda! (Punakas)pruunid,tumeda d laigud,kolletuvad pehmed lehed-ülekastmine, (terav päikese valgus)	Paljundada külgvõsudega.. Istuta ümber märtsis-aprillis kui taim on potist välja kasvanud.	Liigsest niiskusest juuremädanik. Lehetäi, kilptäi, kedriklest, villtäi.
Andre flamingolill *Anthurium andraeanum* *Anthurium* kreeka keeles-sabalill.Viide kandelehe kaenlast välja kerkivale õietõlvikule	Lehed on tumerohelised, südamekujulised, nahkjad. Kasv püstine. Tõlvikud ja kõrglehed püsivad kaua ilusatena. Õied on sirged, kreemikaskollased, rohekad ,valged ja ümbritsetud lehekujulise läikiva kõrglehega(punased, valged)poolvarjus õitsemine tagasihoidlikum kõrgus 50 cm	Valge, poolvari. Ei talu otsest päikest. Soe kasvukoht, kõrge õhuniiskuses kasvab paremini. Temp kp.20°-24° 6 nädalat enne õitsemist 15° Ei talu tuuletõmbust Muld happeline, jämeda-struktuurne, vett hästi läbilaskev	Hoida ühtlaselt niiske, vältida seisvat vett. Talvel vähem kasta, kasvuperioodil rohkem. Muld peab peale kastmist niiske olema, mitte märg. Piserdada, kasta pehme veega. Väldi vee sattumist õitele. Puhasta lehti niiske käsnaga. Eemalda ettevaatlikult vanad õied. Kasvuperioodil väetada 14. päeva tagant. Talvel 1 kuu tagant	Alguses iga 2 aasta tagant, hiljem vajadusel. Paljundada ümberistutamisel külgharude eraldamisega.	Liigne niiskus ja jahedus põhjustab hahkhallitust ja juuremädanikku . Lehetäi, kilptäi, punane kedriklest, villtäi.Kui taim ei õitse ja lehti on palju, siis võib olla põhjuseks liiga suur pott ja vähene val-

					gus.Kollased lehed-liigkastmine ja väeta-mine.Pruunid leheot-sad – vähene niiskus ja kõrvetav päike.
Kuningbegoonia *Begonia rex-cultorum* Sisaldab mürgiseid, limaskesti ärritavaid aineid	Lehed eba-sümeetrilised, pearood jagab 2 erineva suu-rusega pooleksSsüdajalt teritunud, u 20 cm pikkused, suure värvi-valikuga. Roosad õied ühesugulised, emas ja isasõied ühel taimel 	Poovari,varjuline. temp.kp 20°-25° Talvel 5° -7° jahedam. Kesk-mine õhuniiskus ja hea õhuliiku-vus. Kerge, toitaineterikas muld(kompostmuld, freesturvas,liiv). Vältida tuuletõmbust	Mõõdukas kastmine pehme veega (altpoolt) Pärast õitsemist tuleks anda puhkeaega ja kasta harvemini. Väetada üle 1-2nädala nõrga väetise-lahusega, talvel 1 kord kuus. Üleväetamisel kaob lehtede värvikirevus.Kuivanud lehed tuleks eemaldada, et vältida mädanemist.poti pööramine tagab ühtlase kasvu.	Ümber istutusel kasutada n sõna-jalgade mulda. Pott väiksem ,lai ja madal. Paljundada jagamisega, lehe või varrepistikutest,leheosapistikut est,seemnetest Pistikud juurduvad 20 kraadi juures kiiresti. Vajab2-3 paari a tagant uuendamist. Vanemad taimed kaotavad ilu.	Ülekastmine,leh tedel seisev vesi ja jahe ruum soodustavad seenhaigusi. Õhuvaene ruum, liigpalavus või niiskus p jahukastet.Päike -pruune laike. Lehetäid,punane kedriklest,kasvu hoonekarilased,r ipslased
T**ups-rohtliilia** *Chlorophytom comosum* pruudislepp 	Lehed juurmised, kitsad, kaardus, paari cm laiused, 20-40 cm pikkused. Moodustab tiheda rohelise puhma. Esineb ka servast kollaste ja valgete triipudega teisendeid. Pikkadel õisikuvartel ripuvad tütartaimed. Eluiga on 4-5 aastat.	Valgusrohke(trii-buliste lehtega) poolvarjuline või varjuline kasvu-koht. Sobib soojem kui ka jahedam keskkond (talvel 16 kraadi ringis, kuid mitte alla 7 kraadi),mõõdukalt õhuniiske koht.	Kasta lubjavaese toasooja veega, vältida ülekastmist ja äraskuivamist. a.Talvel mõõdukalt, lase mullakihil vahepeal ära kuivada. Mitte jätta potialusele vett seisma. Võib piserdada. Väetada 2 nädala tagant vedelväetisega,väljarvatu d talvel.	Ümberistutada igal kevadel kasutades saviliivast mulda. Muld peab olema vett hästi läbilaskev ja toitaineterikas (nt komposti-liivasegu). Paljundada tütartaimedega.	Liigne kastmine viib lehtede kolletumi-seni.Suvel pruunid lehetipud-palavus ja kuivus.Talvel üle-kastmine. Lehed võivad murduda talvel

					tugeva väeta-mise, liig sooja temp.ja vähese valguse tõttu. Punane kedriklest,lehetä id
Romblehine tsissus *Cissus rhombifolia* 	Vastupidav. Keskmise kasvuga, roni- või ripptaim. Võrsed roosakad, veidi karvased. Võrsete tipus köitraod. Kolmetised läikivrohelised liitlehed,rombjad lehekesed. Ei õitse	Valge kuni poolvarjuline. Otsest päikest ei talu Hästi sobib ida-, lääne- või põhja-suunda avanev aknalaud. 18-22 kraadi sooja, niiskem õhk. Muld viljaks, kuid kastmisvett läbilaskev. Drenaažiks lisada veidi kruusa.	Mullapalli vettimist ja läbikuivamist vältida. Piserdada. Ronimisel vajavad toestust. Vajadusel teha noorenduskuur. Võsude kärpimine soodustab harunemist. aktiivsel kasvuperioodil võib väetada rohelistele taimedele mõeldud lahja väetiselahusega umbes paar korda kuus. Talvel väetada minimaalselt.	Ümberi stutada varakevad – veebruari lõpp, märtsi algus. Istutusmuld võiks olla vett hästiläbi-laskev, liivasegune ja toitaineterikas. Paljundada kevadel ladva- ja varrepistiku-tega. Juurdumiseks vajavad 21kraadi.	Ülekastmine ja kuiv õhk soodustavad lehtede koltumist ja maha-varisemist. Päikesepõletus-lehe servad pruunid, varisevad maha Lehe-, kilp- ja villtäid, kedriklestad ja ripslased.
Mattpunane kliivia *Clivia miniata*	Lehed lineaalsed, nahkjad.,tumerohelised. Serv terve. Paiknevd lehvikjalt. Oranžid või punased lehterjad õied moodustavad sarik-õisiku.)	Otsese päikese eest varjatud, valge kuni pool-valge õhurikas kasvukoht ida- või läänesuunda ava-neval aknalaual või selle lähedal. Varjus ainult leheilu.18°-22° kraadi, talvel	Kevadest suve lõpuni kasta rikkalikult, kuid lasta kastmiskordade vahel mullapinnal veidi kuivada. Ei talu läbivettimist ja alusele kogunevat seisvat vett. Suvisel ajal võib taimelehti piserdada. Puhkeperioodil, suvest 6-	Noortaim istutada ümber iga aasta, vanem 2-3 aasta järel ning pärast õitsemist. Pott võimalikult väike, see aitab kaasa rikkalikumale õitsemisele. Vett hästi läbilaskev nõrgalt happeline muld, kuhu on liiva sisse segatud. Paljundada saab külgharude eral-damisega	Kedriklestad,vil ltäi Pleekinud,pruun id lehed-päikesepõletus Kollased lehed-toitainete puudus, vähene v liigne

 Sisaldab mürgiseid akloide		mitte alla 12°. Ei talu äärmuslikke asukohavahetusi ega sagedast pööramist.	8 nädalat, kasta harva, vaid niipalju, et taim ei kuivaks ega lehed närtsiks. Väetada 2 nädala tagant pärast õitsemist puhkeperioodi saabumiseni..	ümber-istutamise käigus. Noor taim hakkab õitsema 3 a pärast.	kastmine
perekond diifenbahhia *Dieffenbachia spp.* **Tähniline diifenbahhia** (*D. Maculata)*	Kuulub võhaliste (*Araceae*) sugukonda. Lehestik on nahkjas, lopsakas ja kirju. Lehed on ovaalsed pikkusega 15-40 cm. Õis on kreemikas ning ilmub latva lehtrina. Ei oma suurt dekoratiivset väärtust. Toatingimus-tes on keeruline taime õitsema saada. Mahl on mürgine! Hea õhupuhastaja. Sarnane aglaoneemale	Temp.mõõdukas, kasvuperioodil 20-25 kraadi, talvel 17-20 kraadi ning keskkond niiske. Temperatuur ei tohiks langeda alla 16 kraadi. Vältida tuuletõmbust, sest muidu võib lehed maha visata. Talvel valge, suvel poolvarju-line ,ei sobi otsene päikesevalgus	Kasta leige veega rikkalikult kevadest sügiseni, talvel mõõdukalt.. Talvel tuleb taime lehti aeg-ajalt pesta, muul ajal mõjub hästi, kui vahetevahel piserdada. Kevadest sügiseni tuleb taime väetada 10 päeva tagant. Talvel valges kasvukohas 1x kuus. Pikale veninud taime tuleb noorendada peaharu kaelast 10 cm kõrguselt maha lõigates (paljundusmaterjaliks 8-10 cm jupid)	Ümber istutada võib iga kevad veidi suuremasse potti kasutades huumus-rikast, kohevat, pisut happelist mulda . Kõrgema istutuspoti valikul täita põhi drenaažiks kruusa või jämedama liivaga. Paljundada pistikutega. Sobiva pikkusega ladvaosa liivasegusse mulda või vette juurduma. Leht rulli keerata või kilekott peale	Kevadel tuleks arvestada, et liiga ere päike kõrvetab leheservi ja põhjustab lehtede kollasust. Liiga pimedas kohas kahvatub lehtede muster. Kui taime mullapall läbi kuivab, muutuvad leheservad pruuniks, liigniiskuse korral lehed kolletuvad. Esineb kilptäi, lehetäi, villtäi ja

					nahkhallitust.
perekond draakonipuu Dracaena spp. **Ääris-draakonipuu** *Dracaena marginata*	Erinevatel liikidel varieeruvad lehe värv, kuju, pikkus, kuid hooldus on kõikidel laias laastus sama..	Draakonipuud valides tasub meeles pidada, et valge ja kollase-kirjude lehtedega taimed vajavad valgemat kasvu-kohta, tumerohe-lise lehestikuga taimed taluvad ka hämaramat ruumi. Soojalembene 18° -20°,mitte alla 15° Universaalne toalillemuld	Kasta aasta läbi mõõdukalt pehme veega. Kasvuperioodil tuleb taime väetada kord nädalas, talveperioodil kord kuus nõrga väetiselahusega. Taimi võib piserdada. Kõrge õhuniiskus	Nooremat taime tuleks istutada iga aasta kevadel, vanemat2-3 a. tagant. Kasutada viljakat jämeda liivaga segatud mulda. Mullasegusse võib lisada lehtpuusöe tükke või kergkruusa. Paljundada saab külgharudega, ladvapistikutega tüvelõikudega (ca 20 cm pikkused).	Draakonipuud ei talu ülekastmist, leheot-sad muutuvad pruuniks, haigestuvad juured ja taim võib hukkuda.
Kuld nõelköis *Epipremnum aureum* Rahvasuus tarzaniköis. Pikaealine, vähenõudlik. helerohelise- valgekirju sort `Marble queen`	Liaan.,süstjasmunajad, tipust teritunud 6-10 cm nahkjad,läikivad lehed. Terveservalised. kollasekirju Àureum` Õis tõvik, kõrglehe varjus.Toas kasvav t ei õitse. (Looduses vanematel t sulgjad lõhise lehed) 	Poolvari,varjuline (valge kuid otsese päikese eest varjatud.)Sooja-lembene,talvel eelistab mitte alla 16°.Kp 18-25° Tundlik temp kõikumistele.	Armastab piserdamist. Talub mõõdukalt kuivale jäämist. Parasniiske, struktuurne ja vett läbilaskev muld. Liiga rammusas mullas ja liigväetamise puhul jääb lehtede värviline muster tagasihoidlikuks. lämmastikurohke väetis kp 2 nädala tagant	Ümberistutamine paari a tagant. nõrk juurestik = väike pott. Paljundatakse tipmiste, varrepistikutega (4-6l) aastaringselt. Võib panna kohe mulda v juurutada vees.10-12 cm potti 3-5 pistikut. T tuleb kärpida, siis arenevad külgharud. lõika julgelt tagasi suurt taime kasvuperioodil.	Pidevalt niiske muld Võib põhjustada varte, juurte mädanemist. Seenhaigused-märjad pruunid lehed
Bensoe -viigipuu *Ficus benjamina*	Pärit Lõuna- ja Kagu-Aasiast. Looduses kasvab 30 m	Valge, poolvari, vältida otsest päikest. Valgust	Suvel kastetakse rikkalikult, soojas ruumis talvel ka suhteliselt palju.	Kevadel 3-4 l tipmiste varrepistikutega. Lõikepind pestakse soojas piimamahlast	Ei talu liigniiskust. Kahjustajad –

	kõrguseks.Kägistajapuu-Kasvab teise puu tüve najal üles-õhujuured annavad külgharusid, kandurpuu nõrgestub, hukkub kui viigipuu on saanud suure võra. Peenikeste longus lehtedega, lehed sõltuvalt liigist läikivad, ovaalsed, nahkjad, rohelised või mustrilised. Lehe suurus 10-12 cm ,teritunud tipuga	jälgida eriti talvel, sest võib lehti maha lasta valgusepuudusest. Temperatuur 15-22 kraadi, eelistab jahedamat. Vältida külma ja tuuletõmbust	Meeldib piserdamine. Väetamine – kevadest sügiseni väetada roheliste taimede väetisega, üle nädala. Talveperioodil kord kuus või harvem	puhtaks, pistikud pannakse juurduma liiva-turba segusse, kaetakse läbipaistva kilekoti v klaaspurgiga. Juured v kasvatada ka vees. Juurduvad kõige paremini 30° juures.	villtäi, punane kedriklest, kilptäi, lehetäid
Harilik luuderohi *Hedera helix*	Pärineb Euroopast.Kõrgus võib ulatuda 25 meetrini. Lehed on tumerohelised, nahkjad, läikivad ja igihaljad. Kasvatatakse tavaliselt roni- või ripptaimena. Sobib ka puutüvede najale kasvama	Jahedam temperatuur, mõõdukas õhuniiskus, valgurikas, poolvarjuline, vältida otsest päikesevalgust	Kasta mullapalli kuivades (üle kahe nädala), talvel vähem. Kastmiste vahepeal tuleks piserdada. Väetada suvel	Ümberistutus iga paari aasta tagant, huumisrikas parasniiske muld. Paljundada ladvapistikuga	Ei sobi talveperioodilise kasvukoht, pime, kuiv õhk. Kahjustajad – kasvuhoonekarilane, punane kedriklest, villtäi, kilptäi,
Rooshibisk *Hibiscus rosa-sinensis*	Pärineb troopilistelt Aasia aladelt, kasvab kuni 5m kõrguseks, toas 1,5m. Lehed ovaalsed ja piklikud, tihti äärtest sakilised.Kiirekasvuline, suhteliselt vähenõudlik	Kasvuperioodil 18-20 kraadi, talvel 14-16 kraadi. Valge, õhurikas kasvukoht. Õied suured, 10-15 diam. Toas õitseb juulist novembrini.	Kasvuperioodil rikkalikult kasta, talvel tagasihoidlikult(okt-veebr). Muld ei tohi läbi kuivada, valada ära alusel olev vesi. Kuiva õhu puhul piserdamine. Väetada aprillist septembrini 2 ndla tagant	Igal kevadel ümber istutada või peale õitsemist sügisel. Raske, toitaineterikas muld, suhteliselt suur pott. Paljundamine seemnete või pistikutega varakevadel või suve lõpus	Ei talu temperatuurimuutusi. Kahjustajad – kasvuhoonekarilased, punane kedriklest, lehetäid, kilptäid, hahkhallitus

Harilik vahalill *Hoya carnosa* 	Kagu-aasia vihmametsadest, epifüüt.Harud võivad kasvada mitme m pikkuseks, vanemas eas puituvad. Suhteliselt vähenõudlik. Väikesed vahajad õied	Temp.osas vähenõudlik,talvel sobib jahedam (10-15 kraadi), nii puhkeb suvel kergemini õide. Valge kasvukoht	Kasta õitsemise ajal kord nädalas, oktoobist alates harvemini. Mitte jätta potialusele vett. Väetada mõõdukalt, suvel paar x kuus, talvel kord kuus vüi harvemini	Ümberistutus 2-3 aasta tagant, kergem ja nõrgalt happeline toalillemuld, võib lisada orhideede kasvusubstraati. Paljundada ladvapistikuga kevadel või peale õitsemist	Vältida ülekastmist. Vanemad taimed ei talu hästi asukohavahetusi . Kahjustajad – villtäi, kilptäi,
Piklik näsakaktus *Mammillaria elongata* 	USA edelaosa, Mehhiko, Kariibi mere saared jne. Madalakasvulised keraja varrega taimed. Kõikide liikide ühine tunnus on selgelt näsaline vars. Näsad on koonilised, nende tipus kimbuke asteldega. Õied väikesed, kellukjad, arenevad näsade aluselt.	Palju valgust, asetada toa valgeimasse paika. Temperatuur talveperioodil 10 kraadi.	Kastmine – suvel nagu hairilikke toalilli, talvel kastmist ei vaja (nov-veebruar 1x kuus). Jahedas ruumis jätta kuivale sellel ajal.	Ümber istutada 2-3 aasta tagant, kaktusemulda. Istutusnõu lai ja madal.	
Kõrge nefroleep *Nephrolepsis exaltata* 	Pärineb troopilistest Ameerika metsadest. Sõltuvalt liigist lehed kas lainelised ja/või suuremad/väiksemad	Õhurikas 18-20 kraadi kasvukoht, talvel ei tohi langeda alla 15 kraadi. Poolvarjuline või valge, vältida otsest päikest märtsist oktoobrini	Kasvuperioodil tihedam kastmine, puhkeperioodil kord nädalas. Mitte kasutada külma ja karedat vett ega lasta mullapallil läbi kuivada. Kuiva õhu korrla piserdada sooja veega. Väetada üle kahe-kolme nädala, talvel kord kuus tavalisest poole lahjema lahusega	Paljundada võsundite eraldamise teel. Ümberistutamine pärast puhkeperioodi – nooremaid taimi igal aastal, vanemad paari aasta tagant. Viljakas, õhku ja vett läbilaskev muld, väike pott	Kahjustajad – ripslased, lehetäid, villtäi
harilik viigikaktus	Kodumaa Mehhiko.	Suvel soojemas	Korrapärane ja rikkalik	Ümber istutada kevadel	Kahjustajad -

Opuntia vulgaris	Vars koosneb lülidest, lehed on lapsergused ja ellipsikujulised, kasvavad kuni 15 cm pikkuseks, epidermis hallikassinine. Astlad pikad ning nende alusel vaevumärgatavad harjased. Kasv kiire, looduses üle 1 m kõrgused, hästi harunev. Õitseb maist augustini. Hoida talvel jahedas ja väga valges kohas	ruumis, talvel jahe (8-10 kraadi) Minimaalne temp 7 kraadi. Talub kuiva õhku. Talvel valge ja jahe, kevadel kaitsta otsese päikesevalguse eest. Pimedas venib välja	kastmine kasvuperioodil(kevad, suvi), ei ole tundlik liigniiskuse suhtes. Augustis oluliselt vähendada kastmist, talvel kord kuus või harvem, liigne vesi eemaldada aluselt. Väetada suvel (märts-oktoober), nõrk lahus iga 2-3 ndla tagant	(märts-aprill), kasutada kaktusemulda. Nooremaid igal aastal, vanemaid 2-3 aasta tagant. Suhteliselt suurde potti väga tugeva juurestiku tõttu. Paljundada seemnete või pistikutega	kilptäid
kuuking *Phalaenopsis*	Leviala Kagu-Aasiast Põhja-Austraaliani. Epifüüt.Tüvi ca 30 cm pikk, lehed laiad, nahkjad, lihakad. Õitseb 4-5 kuud.	Niiske ja soe keskkond, pisedada aeg-ajalt. Temperatuur 18-25 kraadi, suvel talub kõrgemat. Õiepungade tekkimisel hoida jahedamas, 15-17 kraadi, mitte jätta tõmbetuule kätte. Valge kasvukoht, varjata otsese päikese eest.	Kasta aastaringselt mõõdukalt, õiepungade tekkimisel kastmist vähendada. Õitele mitte lasta vett. Kasta toasooja veega, parim asetada kord nädalas veeanumasse ca 30.minutiks. Väetada kasvuperioodil 2-3 korda kuus, talvel (okt-märts) 1-2 korda	Paljundada jagamise teel, tütartaime mitte eemaldada enne kui ta on kasvatanud 2-3 pärislehte. Ümberistutamine 2-3 aasta järel, kevadel, spets.mulda, soovitavalt läbipaistvasse potti, kuna juured tahavad valgust	Punane kedriklest, ripslased, lehetäid, villtäi, kilptäi
kolmevöödiline havisaba *Sansevieria trifasciata*	Lääne-Aafrika savannidest. Lehed püstised, mõõkjad, kõrgus varieerub sõltuvalt liigis 20cm kuni 3 meetrit. Väga vastupidav ja kergesti	Valge/poolvarjuline kasvukoht.	Kastetakse talveperioodil vähe, aeg-ajalt võib lasta mullapallil täielikult läbi kuivada. Vältida ülekastmist, suvel kasta kord nädalas. Valada potialusele jäänud vesi	Istutada ümber, kui taim hakkab potist välja kasvama. Pott pigem väiksem. Paljundada jagamise teel, pehepistikutest	Kilptäi, villtäi, kedriklest

	hooldatav taim. Õitsemine vanematel taimedel kord aastas, kesksuvel		ära. Väetada kord kuus kasvuperioodil, muul ajal üle nädala		
Wallise tõlviklehik *Spatiphyllum wallisii*	Pärit Lõuna-Ameerikast, eri suurustega liigid. Lehestik tumeroheline ja lopsakas, suhteliselt vähenõudlik. Õisik rohekasvalge pikliku või ovaalse kõrglehega, lehtedest kõrgem	Soojalembene (20-25 kraadi), niiske, poolvarjuline (vältida otsest päikest) kasvukoht. Talvel võib olla ka jahedam, kuni 16 kraadi. Vältida tuuletõmbust	Suvel kasta rikkalikult pehme veega, muul ajal mullapalli kuivades. Valada ära potialusele jäänud vesi, piserdamine aeg-ajalt. Väetada normaalsest poole lahjema väetiselahusega, talvel kord kuus, muidu iga kahe nädala tagant	Ümberistutamine iga paari aasta tagant kevadel, toitaineterikas poorne muld. Paljundada jagamise teel	Kahjustajad -punane kedriklest. Vastupidav haigustele ja kahjuritele
aaloelehine tääkliilia *Yucca aloifolia*	Pärit Kesk-Ameerika kuivematelt aladelt.Agaaviliste sugukonnast. Kareda servaga lehed on jäigad, mattrohelised, nahkjad ja mõõkjad. Lehed moodustavad puhma. Looduses kuni 15m, toas 2-3 m kõrgused. Suhteliselt vähenõudlik. Õied rippuvad, kellukjad, valged või kreemikad	Kasvukoha valik oluline, talvel temperatuur 10-12 kraadi, õhurikas, mitte väga niiske. Talub ka otsest päikest, asetada valgeimasse kasvukohta	Suvel kasta rohkem, talvel vähem, harvem kjui teisi toataimi.Suvel väetada kord kuus, ümberistutamise aastatel mitte väetada.	Ümberistutamine üle aasta, kevadel. Savine huumusrikas muld, millele lisatud liiva. Paljundada külgharudest tehtud pistikutega või tüvetükkidega	Kahjustajad – kilptäi, villtäi. Haigused – juuremädanik (ülekastmisel)
vahemere alpikann *Cyclamen persicum*	Perekond on 22-liigiline ja kuulub nurmenuku-liste sugukonda. Mugultaimed. Lehed	Kasvatatakse valges, jahedas. Õitsemise ajal mitte üle 15° viljakas	Kasta ettevaatlikult ümber poti ääre, vesi ei tohi sattu-da mugulale. Rikkalikult õitsvat lille	Peale puhkeaega, kui ilmuvad esimesed lehed, istutatakse taim samasuurde potti, mugul	Pime ruum liigniiskus, valekast-mine põhjustab

	pika rootsuga, munajad, neerjad, sageli hõbedase mustriga. Õied üksikult pikkadel vartel, tagasi käändunud kroonlehte-dega. Kõrgus20- 25 cm. Looduses väga pikaealine taim ja võib elada kuni 100 a.	muld. Tundlik tuule-tõmbuse, temp. kõikumise suhtes. Õievarred võivad kõverduda, lühikeseks jääda Korduvõitsemiseks vajab puhkeperioodi.	kasta potialuse kaudu. Ülejääk ära valada. Koledad taimeosad, eemaldada järsu tõmbega. Lõikamisel võib mädanik mugulasse sattuda Peale õitsemist paarikuine puhkeaeg. Pärast viimaste pungade puhkemist, kasta vähem. Mugul panna jahedasse ruumi,hoida peaaegu kuivana.	jäetakse poolest saadik mullast välja. Viljakas muld. Vastavalt lehtede arengule hakatakse rohkem kastma.Mõne nädala p väetatakse kuni õitsemise kõrgpunktini.	leherootsude, varte mädanemise. Lehetäid, kedriklestad, hahkhallitus, jahukaste.
Kaunis piimalill *Euphorbia pulcherrima* 	Kesk-Ameerika lehtmetsadest.Põõsas või madal puu, 0,6-4 m kõrgune. Lehed saagja servaga, tumerohelised, 7-16 cm pikad. Iga võrse ülemised lehed värvunud, enamasti punaseks, vahel oranžid või valged, roosad, kreemid- asendavad kroonlehti. Õitseb novembris-detsembris, selle saavutamiseks jälgida ööaja pikendamist	Valge või poolvari Ei meeldi otsene päike. Temp 20°C Pele õitsemist jahedam 16°, Niiske kasvukeskkond. Vältida tuuletõmbust, külma (hakkab lehti langetama)	Hoida ühtlast niiskust, vältida läbivettimist. Kasta 2-3x nädalas toasooja veega, jälgida, et mullapall ei kuivaks läbi. Lehti mitte piserdada. Kasvuperioodil maist septembrini väetada iga kahe nädala tagant või kord kuus. Väetamine lõpetada sügisel	Ümber istutada mais, toitainerikkasse mulda. Varred võib tagasi lõigata 15 cm pikkuseks, peale õitsemist kärpida julgelt (3-4 lehte oksa kohta), väib jätkata kuni juulikuuni. Paljundamine – juulis tugevatele võrsetele sisselõige lüli kohale, oodata kuni piima jooksma, panna juurduma otse puhtasse liiva või liiva-turba segusse.	Kilptäid, kedriklestad, villtäid, karilased, ripslased

Harilik ratsuritäht *Hippeastrum x hybridum*	Kesk-Ameerika troopilistest rohtlatest pärit. Lehed piklikud, läikivad. Toataimedena kasvatatakse loodusliku liigi suureõielisi hübriide. Õied avanevad veebruaris-märtsis, enamasti punased, valged, kirjud. Õisikuvarred 30-70 cm kõrgused, millel asetsevad 2-6 lehterja kujuga õit	Valge kasvukoht, temperatuur talvel 13-18 kraadi. Keskmine õhuniiskus	Kastmine mõõdukas, väetamine oluline eriti pärast õitsemist, kevad-suvel, mil taim valmistab ette järgmise aasta õitsemist. Väetada ja kasta korrapäraselt, mida suuremad lehed, seda olulisem.Vajab talvist puhkeperioodi, selleks viia jahedasse ja hämarasse, mitte kasta, lasta lehtedel kuivada (umbes septembris), tagasi valgusesse ja hakata kastma mõne kuu pärast, et hakkaks õitsema (detsember-jaanuar)	Ümber istutada kohe pärast õitsemist, muld toitainerikas kuid mitte liiga rammus. Lillepoti suurus – põial mahub poti ja sibula vahele. Sibul poolest saadik mullast väljas. Paljundatakse tütartaimedega, mida kasvatatakse 2-3 aastat puhkeperioodideta	Kahjustajad – villtäi Haigused - punapõletik
Blossfeldi kalanhoe *Kalanchoe blossfeldiana*	Pärit Madagaskari mägedelt, püstiselt kasvav püsik, kuni 45 cm kõrgune, tavaliselt 30 cm, laius kuni 30 cm. Lehed tumerohelised, vastupidav ja vähenõudli. Palju eri õievärviga sort, looduslikult õitseb aastaringselt.Õie läbimõõt 1cm, paiknevad väikestes kobarates	Kasvukoht valge, mitte päikeses, alates septembrist 1,5 kuud soovitav pimendada keskkonda 9-10 tunnini, õitsemise soodustamiseks.Temperatuur 16-18 kraadi, talvel jahedamas, mitte alla 10 kraadi. Puhkeperioodil ei vaja palju õhuniiskust	Kasta mõõdukalt, temperatuuri langedes vähem. Võib kasta alt.liigne vesi valada ära. Väetamine kasvuperioodil 1-2 korda kuus, lahja väetiselahusega. Talveperioodil väetada harvem	Ümberistutamine – igal kevadel pärast taime õitsemist, kasutada väikest potti ja liivasegust mulda, mis on toitainerikas ja viljakas. Paljundamine lehtede- või varrepistikutega	Kahjustajad – lehetäi, viinamarja-kilptäi
Simsi	Hiina ja Jaapani mäestike	Jahe, õhurikas	Kastmise osas kapriisne,	Ümberistutamine – kasutada	Kahjustajad –

rododendron *Rhododendron simsii* 	niisketelt nõlvadelt pärit. Looduses kuni 3 m kõrgune, igihaljas. Varred läikivpruunide karvadega kaetud, rododendronist eristab suurus. Õitseb pimedal ajal, sügisel ja kevadel paar kuud. Nõudlik toataim	keskkond. Talvel 5-10 kraadi juures, õitsemine vajab 12-15 kraadist ruumi.Valgusküllane. Mõõdukas niiske õhk, vältida tõmbetuult	kasutada pehmet vett, tundlik kloori ja lubja suhtes. Mullapinda ei tohi üle kasta, samas ei tohi lasta ka läbi kuivada. Oluline, et vesi imbuks ka poti keskossa. Aeg-ajalt võib tõsta veega täidetud anumasse, kuni mulle enam veepinnale ei tule. Kastmiste vahel piserdada toasooja veega (mitte õitsemise ajal) või asetada kõrvale veega täidetud anum. Väetamine – rodoväetisega, iga paari nädala tagant. Kastmisvette võib panna sidruhapet 1g 1 l vee kohta	happelist mulda, üle aasta kevadel pärast õitsemist, mullapalli rikkumata. Savipott madal ja lai Paljundada saab ümber-istutamise ajal poolpuitunud pistikutega märtsist juunini	võrgendlest Haigused – hallmädanik, laiksustõbi
Kannikeseõieline säntpoolia *Saintpaulia ionantha* 	Pärit Ida-Aafrikast. Aretatud väga palju eri sorte, erinevate õitega, õhiseks jooneks lihavad ja akrvased lehed.Keskkonnatingimuste suhtes nõudlik. Õitseb kevad-suvel ja sügis-talvisel perioodil, ent võivad õitseda ka muul ajal	Varjuline kasvukoht, mitte otsene päikesevalgus. Soe ruum, minimaalselt 14-16 kraadi,, keskmisest kõrgem õhuniiskus, stabiilne mullaniiskus.	Sobiv kasvukoht 18-20 kraadi, madalal temperatuuril tekivad kergelt mädanikud. Ei talu liigselt külma. Kasta regulaarselt, vältida lehtede märgumist, lehekodarale vee kogunemist, mullapalli liigniiskust ning vesi peab olema toasoe. Väetada mõõdukalt õitsemise ajal kevad-suvel, muul ajal	Paljundada saab lehepistikutega, võib teha aastaringselt, sobivaim aeg märts-aprill. Samuti võib puhmast jagada. Ümberistutamisel uus pott veidi suurem eelmisest, kasvumuld huumusrikas, nõrgalt happeline, vett hästi läbilaskev	Kahjustajad – ripslane haigused - juuremädanik

			vähe.Õitsemise lõpetanud taime ca kuu mitte väetada. Ei talu temperatuuri suuri kõikumisi, kuiva õhku, kevad- suvist eredat päikest, suitsust ruumi ja tõmbetuult		
Harilik jõulukaktus *Schlumbergerea truncata* 	Brasiiliast pärit, epifüüt. Kasvavad varjulistes vihmametsades. Lüliliste varte tippudes pehmed harjased kaktustele omaste astelde asemel. Õite värvus valgest lillanin, õiepungad tekivad septembris ning nende tekkeks vajab lühikest päeva ja pikka ööd. Sel ajal taime mitte liigutada, õitseb novembri keskelt jaanuari lõpuni	Kasvukoht soe, niiske, rammus muld. Ei talu temperatuuri kõikumist ning kuiva kasvukeskkonda. Põhjasuunda avanev aknalaud on sobiv, hoida lõunapäikese ees. Õiepungade moodustumise ajal hoida 15-20 kraadises soojuses, peale õitsemist 6-8 nädalat 10-12 kraadises, valges ruumis. Juulist alates taas 18-20 kraadi.	Kastmine – pärast õitsemist soovitav anda puhkust 6-8 nädalat, kasta harvem. Märtsis suurendada kastmist 1x nädalas, juulis taas puhkust anda. Mitte lasta täielikult pinda läbi kuivada.Soojas ruumis piserdada veega. Väetamine – õitsemise ajal vedela lilleväetisega, õitsemisest märtsini ei väeta, suvel täisväetisega kaks x kuus	Paljundada varrest lõigatud pistikutega – 3-5 varrelüli pikkused panna suvel kergesse liivasegusse juurduma. Ümberistutamine – märts-aprill, üle aasta, nooremaid igal aastal.Rammus mul, viljakas ja suurema turbasisaldusega, vett ja õhku läbilaskev	Kahjustajad – villtäi, kilptäi Varrelülide või õiepungade varisemine võib olla tingitud kaaliumi- või fosforväetise puudusest.

India krüsanteem *Chrysanthemum indicum* 	Pärineb Hiinast ja Jaapanist, potitaimede kõrgus 30-60 cm. Lehestik roheline ja tihe, suhteliselt vähenõudlik taim. Puhkeb õide sügisel,augustist septembrini, kui päev on alla 12 h pikkune. Õisi palju eri värve	Päikeseline kasvukoht, ka talvel. Suvel vältida otsest päikesevalgust. Temperatuur talvel jahedam (13-14 kraadi), õues või kasvuhoones kasvades talub ka mõnekraadist külma. Soojas ruumis õitseb lühikest aega	Kastmine – veevajadus suur, talvel hoida mulda veidi kuivemana, harva kastes. Soovitav altkastmine. Õied ja lehed ei talu vett. Väetada mõõdukalt, õitsvatele taimedele mõeldud väetisega, pärast õitsemist vähe ja talvel üldse mitte	Paljundada ladvapistikutega kevadest suve alguseni. Ümberistutamine – kevadel-suvel võib aeda istutada. Sügisel taas potti ja tuppa, talveks võib viia ka keldrisse või mujale jahedasse kohta. Muld peaks olema huumusrikas	Mädanik ja seenhaigused
Harilik kalla *Zantedeschia aethiopica* 	Lõuna-Aafrika soostunud, suviti kuivade alade taim. Lihaka risoomi, nooljate lehelabadega juurmised lehed ja kuni 1 m pikkuse õisikuvarre tipus asetsev tõlvikõisik, mida ümbritseb valge, kollane, roosa torbikukujuline kõrgleht.	Temperatuur mõõdukas, jahe. Kasvu algul (sept-dets) hoida jahedamas (10-12 kraadi) õitsemise tippajal jaanuarist aprillini 15-18 kraadi. Suvel õue. Valguslembene, kuid mitte otsene päikesevalgus	Kastmine – õitsemise ajal korralikult, mullapall pidevalt mõõdukalt niiske. Puhkeajal (mai-august) ja peale istutamist vähendada kastmist oluliselt. Väetamine – õitsemise ajal regulaarselt üle kahe nädala, toalillede täsväetisega. Enne õitsemist ja õitsemise ajal kasutada õitsemist soodustavaid väetiseid	Vajab suurt potti, viljakat, huumusrikast mulda, mis laseb hästi õhku läbi. Värviliste õitega kallad vajavad pikka puhkeperioodi ja happelist mulda.Istutades oluline, et mugula kumeram pool asub allpool, sest nõgusalt kasvavad uued lehed ja õisikuvarred. Ümberistutamine soovitavalt augustis. Paljundada jagamise teel	Kahjustajad – ripslane, punane kedriklest
Liilia *Lilium*	Pärit Euroopast, Aasiast, Põhja-Ameerikast. Lehed kas kaar- või rööproodsed, süstjad, harilikult rootsuta, paigutuvad vaheldumisi või männastena püstisel varrel. õieehitus enamasti	Valge kasvukoht, temperatuur ca 15-20 kraadi.	Kui lehed hakkavad kolletuma, vähendada kastmist,kuni pealsed kuivavad. Puhkeperioodiks koos potiga jahedasse, kuiva ruumi. Kevadel jälgida,	Paljundada tütarsibulatega, siblasoomustega, maa-aluste varresibulatega, lehe- ja varrepistikutega. Ümberistutamine – suveks õue või kevadel, kasvu alguses,	Haigused – hahkhallitus Kahjustajad – lehetäid, ripslased

	kolmetine, õiekate lihtne, kroonjad lehed erksad ja värvikad		millal varrealge kasvama hakkab, tõsta soojemasse kohta (15 kraadi), alustada kastmisega. Väetada alates kasvuperioodi algusest (kui uus muld, pole vaja). Suveks aeda või kütteta kasvuhoonesse	viljakasse mulda istutada	

Kärt Tilk

Alice Läänson